**WINKLER LTDA. Microbiología**
www.winklerltda.cl
Fono (56-2) 2482 6500
El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile
Empresa con certificación ISO 9001:2015. ISP EDM 417/18. R. Ext Nº6099
**"Elaboración, comercialización, y distribución de reactivos y productos biológicos de diagnóstico"**

# Torulin con medio de transporte Gel Fisiológico T'enT'- SS®

635133 100 unidades de tubo de trasporte con 4 ml de columna gel fisiológico y tórula de fibra sintética estéril individual.

Medio para transporte y cultivo de secreciones vaginales e identificación de *Trichomonas spp.*
Se utiliza para el examen directo de secreciones vaginales y uretrales en las cuales se debe investigar la presencia de *Trichomonas vaginalis.* La concentración apropiada de sales, el óptimo pH del medio, aunado a la inclusión de agarosa en éste lo hace el medio de preferencia para la observación directa de secreciones. *Trichomonas vaginalis* puede permanecer vivo hasta por 6 horas a 37ºC después de obtenida la muestra.
El tubo de transporte es fabricado en polipropileno con fondo redondo de Ø 12 mm, altura 150 mm y estreches Venturi.
Tórula con aplicador o punta de fibra sintética de Ø 5 mm con mango plástico no quebrable de 150 mm de largo aproximado.
Producto estéril envasado individualmente con etiqueta de Sello Seguro indicando lote y vencimiento.
Esterilizado mediante óxido de etileno y/o radiación gamma. Durabilidad de 3 años.

**Composición (g / L):**

| | |
|---|---|
| Cloruro de sodio | 9,0 |
| Agar bacteriológico | 5,0 |

pH final del medio de cultivo listo para su uso: 7,2 ± 0,2.

Preparado según especificaciones del fabricante y según norma ISO 11133:2014.

Posteriormente a cada uso volver a sellar la bolsa. Conservar en un lugar fresco y seco entre 5 y 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

Resultados esperados de preservación de la muestra hasta 2 días.

| **Funcionalidad cualitativa** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cepa control** | **ATCC** | **Desarrollo** | | | |
| | | **0 h** | **8 h** | **24 h** | **48 h** |
| *S. aureus* | 6538 | A | A | A | A |
| *E. faecalis* | 33186 | A | A | A | A |
| *T. vaginalis* | - | V | V | V | |
| **Control de esterilidad** | | | | | |
| Sin desarrollo a 10 días de incubación a 25 ± 2 °C | | | | | |

A = Abundante
V = Viables

IVD DIAGNÓSTICO IN VITRO · REF Nº CÓDIGO · LOT Nº LOTE · ESTERIL OE ESTÉRIL ÓXIDO DE ETILENO · EXPIRA · TEMPERATURA ALMACENAMIENTO · PROTEGER DE LA LUZ · PROTEGER DE HUMEDAD · FRÁGIL · NO USAR EMPAQUE DAÑADO · DESCARTAR · FABRICANTE · INSTRUCCIONES DE USO